

ГНЕЗДОВАНИЕ КОБЧИКА (*Falco vespertinus* L.) НА ЮГЕ КИЕВСКОГО ПОЛЕСЬЯ

С. В. Домашевский¹, В. А. Костюшин²

¹ Украинский центр исследований хищных птиц, г. Киев, Украина

² Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины,
г. Киев, Украина

До середины второй половины XX в. кобчика (*Falco vespertinus* L.) на севере Украины относили к немногочисленным гнездящимся перелетным видам (Зубаровский, 1977). Данных о его гнездовании в зоне Киевского Полесья практически нет. Последнее гнездование вида нами было отмечено на юге Киевской обл. (в лесостепной зоне) 8.05.1989 в Фастовском и 20.05.1989 в Броварском районах (Домашевский, 2006). Позже информации из Киевской обл. о гнездовании вида ни в Лесостели, а тем более в Полесье, не поступало.

Лишь спустя почти 20 лет кобчик вновь обнаружен на гнездовании недалеко от г. Киев. Территориальную пару птиц мы наблюдали 9.05.2007 в правобережной части поймы р. Десна между селами Новоселки и Нижняя Дубечня Вышгородского р-на. Самка кобчика находилась в старой постройке серой вороны (*Corvus cornix* L.), расположенной на одиночном тополе на высоте 16 м. Самец сидел возле гнезда. Потревоженные человеком, птицы слетели, но вскоре вернулись к гнезду. Кобчики активно атаковали пролетающих поблизости серых ворон, которые проявляли интерес к гнездовой постройке.

Вторая пара кобчиков отмечена 7.06.2007 в левобережной части поймы р. Десна у с. Зазимье Броварского р-на. Старое гнездо серой вороны, которое заселили соколы, располагалось в группе деревьев из трех тополей на высоте 20 м. Самка сидела на гнезде. Мы наблюдали, как самец передавал ей корм, при этом птицы громко кричали, после чего самец улетел на охоту, оставив самку на гнезде.

Здесь же на лугах охотящуюся птицу из этой пары наблюдали 31.06.2007. Результаты гнездования нами прослежены не были.

Появление кобчика на гнездовании в Киевском Полесье в 2007 г. мы связываем с его гнездовой дисперсией из более южных районов его ареала. Осенью 2007 г. на некоторых орнитологических страницах в Интернете появилась информация о встречах групп кобчиков в период миграции в более северных (государства Прибалтики, Северная Беларусь, Ленинградская и Московская области Российской Федерации и пр.) от мест основного гнездования районах. Вероятно, эти встречи были обусловлены появлением кобчиков на гнездовании на территориях, где их давно не регистрировали. Нами 29.09.2007 в 17:00 на окраине г. Киев в пределах жилого массива «Троищина» была встреченна мигрирующая группа кобчиков, состоявшая из 21 ос. Это самая крупная группа птиц, отмеченная нами за последние 20 лет в районе исследований.

Литература

- Зубаровский В. М. Хижі птахи. — К. : Наук. думка, 1977. — 332 с. (Фауна України. Птахи; Т. 5. Вип. 2).
Домашевский С. В. Материалы по экологии мелких соколов на севере Украины // Стрепет. — 2006. — Т. 4, вып. 2. — С. 42–58.